Saxenda (Liraglutide) 18mg/3ml/pen 3支/盒 x ____ 盒
打法 每天 ：
☐ 每天 mg/SC X 天
☐ 每天 mg/SC X 天
☐ 每天 mg/SC X 天
☐ 每天 mg/SC X 天
Ozempic (Semaglutide) 4mg/3ml/pen x _____ 支
打法 每週：
☐ 第一週 mg/SC
☐ 第二週 mg/SC
☐ 第三週 mg/SC
☐ 每週 mg/SC
Rybelsus (Semagultide) 14mg/#
服法： 早上空腹，配水 < 120CC, 服後禁食30分鐘
☐ 每___天 一顆 X 天/共_____顆
☐ 每天 一顆 X 天/共_____顆
Contrave (Naltrexone 8mg/Bupropion 90mg)
服法：
☐ 每___天 ___顆 X 天/共_____顆
☐ 每天 ___顆 X 天/共_____顆
☐ 每天兩次 ___顆 X 天/共_____顆
Mounjaro KwikPen (tirzepatide) 5 mg/0.6 ml x 4 /pen
打法 每週：皮下 x _____ 支
☐ 第一週 2.5 mg/SC 30 格
☐ 第二週 _____ mg/SC _____ 格
☐ 每週 _____ mg/SC _____ 格
☐ 每週 5 mg/SC 60 格
Mounjaro KwikPen (tirzepatide) 多劑量注射筆
_____ (2.5、5、7.5、10) mg/0.6 ml x 4 /pen
打法 每週：皮下 x _____ 支
☐ 第一週 _____ mg/SC 30 格
☐ 第二週 _____ mg/SC _____ 格
☐ 每週 _____ mg/SC _____ 格
☐ 每週 _____ mg/SC 60 格